

Разведение специализированных мясных пород (гетерофордской, шортгорнской, абердин-ангусской, голловейской и др.) начали в Англии. Затем эти породы стремительно распространились в странах Южной Америки, в Австралии, США, бывших республиках СССР и др. Животные этих пород скороспелы, сочетают высокую энергию роста со склонностью к ожирению в молодом возрасте. Кроме того, они хорошо приспособлены к пастбищному содержанию в условиях умеренного климата и дают «мраморное» мясо, которое благодаря своей нежности и сочности имеет превосходное качество.

Животные этой группы мясных пород отличаются сочетанием высокой энергии роста, его способностью их к интенсивному откорму для убоя в раннем возрасте (14- 16 месяцев). Скот приспособлен к пастбищному содержанию в условиях умеренного климата. На основе скрещивания с британскими породами созданы породы и по-родные группы мясного скота:

- в США - брафорд, брангус, бралерс, бифмастер, барзона, санта-гертруда;
- в Канаде - кэтталло, конвертер;
- в Австралии - серый муррейский скот;
- во Франции - арморикана, мен-анжу;
- в Африке - бонсмара;
- в бывшем СССР - казахская белоголовая, курган-ская.

Селекционная работа с мясными породами скота британского корня направлена на увеличение молочности коров и крупности животных, улучшение их мясных форм телосложения, оплаты корма, снижение склонности к излишней наживровке.

К наиболее распространенным классическим породам британского корня относятся:

- -геррефордская;
- -абердин-ангусская;
- -шортгорнская;
- -галловейская;
- -бифбилд;
- -шотландская (хайландская);
- -линкольнская красная;
- -редпол (красная безрогая);

- -девовская (южнодевовская);
- -суссекская (суссекс);
- -северная уэльская;
- -линг;
- -декстер (декстерская);
- -белая британская комолая.